

## VIDENSKAB OG PRAKSIS | KASUISTIK

efter MTX-behandling. Derfor har nogle foreslået at kombinere medicinsk behandling med bilateral embolisering af arteria uterina [4].

Lokal MTX er et godt alternativ til systemisk MTX, idet sidstnævnte ikke altid lykkes, og der er få systemiske bivirkninger af lokalbehandling. Tidlig diagnostik er væsentlig, da lav gestationsalder øger successen [1, 4]. I tilfælde med tilgrudget graviditet er behandling med systemisk MTX mere simpel og effektiv på trods af bivirkninger [4]. Graviditet efter tidligere graviditet i en sectiocikatrice er behæftet med betydelig risiko for præterm forløsning, uterusruptur, placenta accreta, hysterektomi ved sectio og føtomaternel død [5].

Viden om, at primærbehandling bør være medicinsk frem for kirurgisk, er vigtig sammen med tidlig diagnostik for at minimere risikoen for akut, omfattende blødning ved graviditeter i sectiocikatrice.

Korrespondance: *Tina Storgaard*, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Kvinde-Barn-Centeret, Herning Sygehus, DK-7400 Herning.  
E-mail: [tina\\_storgaard@hotmail.com](mailto:tina_storgaard@hotmail.com)

Antaget: 25. april 2005  
Interessekonflikter: Ingen angivet

Ovenstående artikel bygger på en større litteraturregning. En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatterne.

**Litteratur**

1. Seow KM, Huang LW, Lin YH et al. Cesarean scar pregnancy: issues in management. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2004;23:247-53.
2. Maymon R, Halperin R, Mendlovic S et al. Ectopic pregnancies in a Caesarean scar: review of the medical approach to an iatrogenic complication. *Hum Reprod Update* 2004;10:515-23.
3. Shih JC. Cesarean scar pregnancy: diagnosis with three-dimensional (3D) ultrasound and 3D power Doppler. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2004;23:306-7.
4. Marchiole P, Gorlero F, de Caro G et al. Intramural pregnancy embedded in a previous Cesarean section scar treated conservatively. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2004;23:307-9.
5. Seow KM, Hwang JL, Tsai YL et al. Subsequent pregnancy outcome after conservative treatment of a previous cesarean scar pregnancy. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2004;83:1167-72.

**Hjælp os med at prøvekøre det nye manuskriptsystem**

I efteråret 2006 tages Ugeskriftets nye internetbaserede manuskriptsystem i brug. Forfattere, bedømmere, redaktører og redaktionssekretariatet kommer til at bruge det til håndtering af alle typer af manuskripter. Systemet vil gøre redaktionsprocessen lettere og hurtigere.

Men al begyndelse er svær. Derfor vil vi gerne have hjælp til at teste systemet i forbindelse med indsendelse af nye manuskripter, inden det officielt åbnes.

Så har du et nyt videnskabeligt manuskript klar til indsendelse, samt lyst til at hjælpe os, bedes du kontakte Tine Højlund Andersen i redaktionssekretariatet på [tih@dadl.dk](mailto:tih@dadl.dk) eller på telefon 3544 8279.

*Redaktionen*

**Lægemiddelstyrelsen****Tilskud til lægemidler**

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 31. juli 2006 ydes generelt tilskud efter sygesikringslovens § 7 til følgende lægemidler:

(N-D4-BC-04) Adartrel filmovertrukne tabletter\*, GlaxoSmithKline Pharma A/S

(A-10-AB-06) Apidra OptiSet injektionsvæske, Aventis Pharma A/S

(N-06-AB-10) Cipralext filmovertrukne tabletter\*, PharmaCoDane ApS

(C-09-DA-03) Cotareg filmovertrukne tabletter\*, PharmaCoDane ApS

(R-03-AC-03) Terbasmin Turbuhaler inhalationspulver\*, 2care4 ApS

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme

Denne bestemmelse trådte i kraft den 31. juli 2006.

\*) Omfattet af tilskudsprissystemet.