

Nyhed

## Abrupt ophør med benzodiazepiner udløste svært delirium

*Pludseligt ophør eller for hurtig nedtrapning af benzodiazepinbehandling kan give uro, søvnløshed, krampeanfald og delirium med konfusion.*

Med udgangspunkt i en sygehistorie hos en 51-årig mand af asiatisk etnicitet, som i flere år var i benzodiazepinbehandling i hjemlandet og efterfølgende i Danmark, gennemgår Mäkinen et al abstinenssymptomer ved ophør eller for hurtig nedtrapning af benzodiazepinbehandling og diskuterer den korrekte behandling af tilstanden.

Læs kasuistik

[Livstruende delirium udløst efter pludseligt ophør af langvarig behandling med benzodiazepiner](#)

Vivi-Nelli Mäkinen, Kenneth Brandt Hansen & Søren Tang Knudsen

Indholdsstof, mg	T <sub>1/2</sub> , h
<i>Fra hjemlandet</i>	
Zolpidem, 10	2-3
Flunitrazepam, 2	- <sup>a</sup>
Quazepam, 15	- <sup>a</sup>
Etizolam, 0,5	- <sup>a</sup>
Cloxazolam, 2	- <sup>a</sup>

T<sub>1/2</sub> = halveringstid [3].

a) Ikke tilgængelig på [pro.medicin.dk](http://pro.medicin.dk).

Medicinliste fra patientens hjemland. Udsnit af Tabel 1.

Redaktionen